# sLV5FU2 療法

| 適応 | 大腸癌 |
|---|---|

| 催吐性リスク | 軽度 |
|---|---|

| | | | Day1 | Day8 | Day14 |
|---|---|---|---|---|---|
| l-LV | 200mg/m$^2$ | DIV，120min | ● | | |
| 5-FU | 400mg/m$^2$ | IV，bolus | ● | | |
| 5-FU | 2,400mg/m$^2$ | CIV，46hr | ● | | |

※トレフューザー typeT 使用

2週間毎，PDまで

| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① グラニセトロンバッグ3mg 50mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 15min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② レボホリナート 200mg/m$^2$ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5%ブドウ糖液 250mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 120min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 5-FU 400mg/m$^2$ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 5-FU 2,400mg/m$^2$ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 140mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIV 46hr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |