V-4-01

BEP 療法

適応	胚細胞腫瘍

催吐性リスク	高度

			Day	1	2	3	4	5	・・	8	15	21
VP-16	100mg/m^2	DIV，120min		●	●	●	●	●				
CDDP	20mg/m^2	DIV，120min		●	●	●	●	●				
BLM	30mg/body	DIV，30min		●						●	●	

3週間毎，4コース

		Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
① ソルアセトF輸液	500mL			●	●	●	●	●																							
	DIV	120min																													
② エトポシド 100mg/m^2				●	●	●	●	●																							
生理食塩液注	500mL			●	●	●	●	●																							
	DIV	120min																													
③ ソルデム3A輸液	500mL			●	●	●	●	●																							
	DIV	120min																													
④ マンニットールS注射液	300mL			●	●	●	●	●																							
	DIV	60min																													
⑤ グラニセトロンバッグ3mg	50mL			●	●	●	●	●																							
デキサート注射液	9.9mg			●	●	●	●	●																							
	DIV	30min																													
⑥ シスプラチン 20mg/m^2				●	●	●	●	●																							
生理食塩液注	500mL			●	●	●	●	●																							
	DIV	120min																													
⑦ ソルアセトF輸液	500mL			●	●	●	●	●			●							●													
	DIV	120min																													
⑧ ソルデム3A輸液	500mL			●	●	●	●	●			●							●													
	DIV	120min																													
⑨ ブレオ 30mg/body				●							●							●													
生理食塩液注	100mL			●							●							●													
	DIV	30min																													
⑩ ソルアセトF輸液	500mL			●																											
	DIV	120min																													