# CPT-11+Bev 療法

| 適応 | 大腸癌 |
|---|---|

| 催吐性リスク | 中等度 |
|---|---|

| | | | Day1 | Day8 | Day14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevacizumab | 5mg/kg | DIV，90→60→30min | ● | | |
| CPT-11 | 150mg/m$^2$ | DIV，90min | ● | | |

2週間毎，PDまで

| Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① アロキシバッグ0.75mg 50mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 9.9mg | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 15min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② アバスチン 5mg/kg | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 100mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 90→60→30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ イリノテカン 150mg/m$^2$ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 500mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV 90min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |