# CBDCA+GEM 療法

| 適応 | 非小細胞肺癌 | 催吐性リスク | 中等度* |
|---|---|---|---|

| | | | Day1 | Day8 | Day15 | Day21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM | 1,000mg/m$^2$ | DIV，30min | ● | ● | | |
| CBDCA | AUC 5 | DIV，60min | ● | | | |

3週間毎，4-6コース

| | Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① グラニセトロンバッグ3mg | 50mL | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デキサート注射液 | 4.95mg | | ● | | | | | | | ● | 3.3mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV | 30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② ゲムシタビン 1,000mg/m$^2$ | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液注 | 100mL | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV | 30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ カルボプラチン AUC 5 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5%ブドウ糖液 | 250mL | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIV | 60min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |